

PROVA NON ESAMINATA

PM

AZIENDA REGIONALE A.S.L. "NO"

(sede legale: Viale Roma, 7 – 28100 NOVARA)

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO/INFERMIERE CAT. D**

PROVA SCRITTA N. 1

- 1. Indicazioni all'utilizzo del cateterismo vescicale:**
 - a) Ritenzione urinaria acuta
 - b) Necessità di monitorare la diuresi nei pazienti critici
 - c) Nella preparazione del paziente per alcuni interventi chirurgici
 - d) Tutte le risposte sono corrette
- 2. L'identificazione del paziente durante la fase di accoglienza in sala operatoria prevede:**
 - a) Accertamento circa il motivo dell'intervento, la tipologia dell'anestesia alla quale sarà sottoposto e la documentazione del paziente
 - b) La verifica dell'identità attraverso un documento di riconoscimento e il motivo dell'intervento chirurgico
 - c) Verifica attiva dell'identità, il motivo e il sito dell'intervento chirurgico ed il confronto con la documentazione del paziente
 - d) Nessuna delle risposte
- 3. Secondo l'art 41 D.Lgs 81/08, chi esprime i giudizi di idoneità specifica al lavoro?**
 - a) Il Medico Competente
 - b) Il datore di lavoro assieme al Medico Competente
 - c) Il Direttore dell'Ufficio Personale dell'Azienda
 - d) Il Servizio di Prevenzione e Protezione
- 4. Quale, tra le seguenti, risulta essere una potenziale complicanza nell'immediato post operatorio?**
 - a) Infezione della ferita chirurgica
 - b) Malnutrizione
 - c) Ritenzione urinaria
 - d) Nessuna delle risposte
- 5. Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:**
 - a) Prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con la persona assistita
 - b) Prima di procedure invasive
 - c) Come preparazione alle attività di strumentazione perioperatoria
 - d) Al termine delle attività di strumentazione perioperatoria
- 6. Con quale modalità viene classificato il grado di gravità/priorità di un paziente che accede al Pronto Soccorso?**
 - a) Attraverso l'attribuzione di un codice colore o numerico
 - b) Attraverso la consegna di un numero progressivo in relazione all'arrivo del paziente
 - c) Attraverso la disponibilità del personale sanitario nelle sale visita
 - d) Attraverso i dati che l'infermiere rileva nella documentazione del paziente
- 7. Quali ausili ergonomici l'infermiere deve utilizzare nello spostamento letto-carrozzina di un paziente totalmente dipendente?**
 - a) Il sollevatore con imbragatura, per non correre rischi di caduta della persona
 - b) Il disco girevole e le cinture ergonomiche, per conservare e potenziare le capacità residue della persona, mantenendo un elevato livello di sicurezza
 - c) La cintura ergonomica



- d) I teli antiatrito, perché favoriscono lo scivolamento della persona, dal bordo del letto alla carrozzina

8. Con il termine emiplegia si intende:

- a) Una paralisi o deficit completo di forza di un lato del corpo dovuta ad una lesione nel lato opposto del cervello
- b) Uno stato di debolezza di un lato del corpo dovuto ad una lesione nell'emisfero opposto
- c) La resistenza offerta allo stiramento passivo del muscolo
- d) Un deficit parziale di forza degli arti inferiori

9. Quali caratteristiche deve presentare il sistema di confezionamento del materiale sterile?

- a) Il viraggio di colore degli indicatori di sterilità, in presenza della data di sterilizzazione
- b) L'integrità della confezione, il codice dell'operatore che ha eseguito la sterilizzazione, la data di scadenza
- c) L'integrità della confezione, il viraggio di colore degli indicatori di sterilità, la data di scadenza sulla confezione.
- d) Solo la data di scadenza

10. Qual è lo scopo della valutazione pre-operatoria?

- a) Prevenire le complicanze post operatorie
- b) Pianificare la preparazione del paziente all'intervento
- c) Identificare il paziente a rischio di complicanze anestesologiche
- d) Tutte le risposte sono corrette

11. Per melena si intende:

- a) L'emissione dal retto di sangue rosso vivo
- b) La contrazione spasmodica dello sfintere anale con il bisogno persistente di defecare con poca o assente produzione di feci
- c) L'eccessiva presenza di gas nel lume intestinale che determina la distensione delle pareti e la fuoriuscita del gas (flato) dall'ano
- d) L'emissione di feci nere dal retto, di aspetto piceo e maleodoranti, di consistenza poltacea

12. Quali sono le scale più comunemente utilizzate per la valutazione del dolore:

- a) CONLEY
- b) VAS; VDS; NRS
- c) BRADEN
- d) NORTON

13. Per pollachiuria si intende:

- a) La perdita involontaria di urina
- b) L'elevata frequenza di minzioni
- c) L'eccessiva quantità di urina prodotta
- d) La minzione difficoltosa o dolorosa

14. Qual è il veicolo di trasmissione più frequente delle infezioni ospedaliere?

- a) Saliva
- b) Mani
- c) Trasfusioni
- d) Liquidi biologici

15. In relazione all'uso dei guanti quale affermazione è errata?

- a) Occorre utilizzare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso
- b) L'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani
- c) Occorre tenere i guanti non sterili durante l'igiene dei pazienti



- d) Occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario
16. **Il signor CF deve eseguire una puntura lombare. Quale complicanza potrà comunemente manifestare?**
- a) Sonnolenza
 - b) Cefalea
 - c) Vomito
 - d) Dolore toracico
17. **Quali scelte sono indicate nel posizionamento del catetere vescicale a permanenza?**
- a) Scelta del calibro del catetere in relazione all'età del paziente
 - b) Scelta di un catetere del minor calibro possibile e utilizzo di sacca a circuito chiuso
 - c) Scelta di un catetere di calibro non inferiore a 20 Ch al fine di favorire una buona diuresi
 - d) Scelta di un catetere di piccolo calibro e sistema a circuito aperto al fine di favorire una buona diuresi
18. **In base alle più recenti raccomandazioni sulla prevenzione delle infezioni associate alla presenza di catetere intravascolare, come deve essere gestita la medicazione di inserzione del catetere venoso periferico (CVP)?**
- a) Utilizzare una medicazione sterile, semipermeabile e trasparente per coprire il sito di inserzione del CVP
 - b) Utilizzare acqua ossigenata per la medicazione e medicare a piatto
 - c) Utilizzare una pomata antibiotica sul sito di inserzione e coprire con medicazione sterile
 - d) Utilizzare soluzioni a base di iodofori e coprire con cerotto medicato
19. **Cosa si intende per effetti collaterali di un farmaco:**
- a) Gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
 - b) Gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
 - c) Gli effetti farmacologici non desiderati e non prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
 - d) Gli effetti tossici provocati da scorretta somministrazione del farmaco
20. **Da che cosa è provocata la scabbia?**
- a) Da un acaro
 - b) Da un virus
 - c) Da un batterio
 - d) Da un prione
21. **Le lesioni da pressione necessitano di una detersione routinaria. E' raccomandato pertanto l'utilizzo di:**
- a) Disinfettanti a base di iodopovidone
 - b) Soluzione fisiologica
 - c) Clorexidina
 - d) Sali di Ammonio Quaternario
22. **La persona assistita a cui va eseguito un clisma fleet deve assumere posizione:**
- a) Laterale sinistra con arto flesso
 - b) Laterale destra con arto flesso
 - c) Genu-pettorale
 - d) Prona
23. **La riduzione del rischio infettivo in Unità di Terapia Intensiva si fonda sul rispetto di determinate norme igieniche tra cui:**
- a) Lavaggio frequente delle mani del personale sanitario
 - b) Profilassi anti-micotica a tutti i pazienti ricoverati
 - c) Posizionamento di CVC a tutti i pazienti ricoverati



- d) Profilassi antibiotica ad ampio spettro al momento del ricovero
24. **Quale dei seguenti cateteri vescicali è semirigido e ha un'angolazione di 30°?**
- a) Tiemann
 - b) Foley
 - c) Nelaton
 - d) Nessuno dei precedenti
25. **Al fine di prevenire lo sviluppo di lesioni da pressione nei soggetti a rischio è importante:**
- a) Ridurre al minimo frizione e attrito sulla superficie di appoggio della cute
 - b) Effettuare le mobilizzazioni trascinando il paziente sulle lenzuola
 - c) Ridurre la frequenza dell'igiene perineale in caso di incontinenza fecale
 - d) Ridurre al minimo frizione e attrito sulla superficie di appoggio della cute e favorire la mobilizzazione precoce
26. **Nei pazienti in degenza protratta, la scala di Braden:**
- a) Dovrebbe essere rivalutata almeno una volta ogni due settimane
 - b) Dovrebbe essere rivalutata soltanto una volta al mese
 - c) Dovrebbe essere rivalutata ogni sette giorni, ogni qualvolta le condizioni del paziente si modificano e alla dimissione
 - d) In previsione del trasferimento del paziente ad altro reparto e prima della dimissione
27. **Nell'esecuzione della clearance creatinica delle 24 ore, il paziente nel raccogliere le urine deve:**
- a) Includere la minzione di inizio della raccolta e tutte le successive compresa quella di chiusura della raccolta
 - b) Includere la minzione di inizio raccolta e tutte le successive esclusa quella di chiusura della raccolta
 - c) Escludere la minzione di inizio raccolta e includere tutte le successive compresa quella di chiusura della raccolta
 - d) Escludere la minzione di inizio raccolta e includere tutte le successive esclusa quella di chiusura della raccolta
28. **In caso di pneumotorace iperteso, per quale manovra salvavita occorre predisporre il materiale?**
- a) Per il posizionamento di un drenaggio toracico
 - b) Per eseguire una fasciatura del torace con bendaggio tipo Desault
 - c) Per eseguire l'intubazione oro tracheale
 - d) Per eseguire broncoscopia
29. **Con quale Legge è stato abrogato il mansionario dell'infermiere?**
- a) DM. 739/94
 - b) L. 42/99
 - c) L. 251/2000
 - d) Legge 43/2006
30. **Quale normativa definisce l'obbligo di iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche?**
- a) Legge 43/2006
 - b) L. 251/2000
 - c) DM 739/94
 - d) L.42/99



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO/INFERMIERE CAT. D

PROVA SCRITTA N. 1

1. **Indicazioni all'utilizzo del cateterismo vescicale:**
 - a) Ritenzione urinaria acuta
 - b) Necessità di monitorare la diuresi nei pazienti critici
 - c) Nella preparazione del paziente per alcuni interventi chirurgici
 - d) Tutte le risposte sono corrette
2. **L'identificazione del paziente durante la fase di accoglienza in sala operatoria prevede:**
 - a) Accertamento circa il motivo dell'intervento, la tipologia dell'anestesia alla quale sarà sottoposto e la documentazione del paziente
 - b) La verifica dell'identità attraverso un documento di riconoscimento e il motivo dell'intervento chirurgico
 - c) Verifica attiva dell'identità, il motivo e il sito dell'intervento chirurgico ed il confronto con la documentazione del paziente
 - d) Nessuna delle risposte
3. **Secondo l'art 41 D.Lgs 81/08, chi esprime i giudizi di idoneità specifica al lavoro?**
 - a) Il Medico Competente
 - b) Il datore di lavoro assieme al Medico Competente
 - c) Il Direttore dell'Ufficio Personale dell'Azienda
 - d) Il Servizio di Prevenzione e Protezione
4. **Quale, tra le seguenti, risulta essere una potenziale complicanza nell'immediato post operatorio?**
 - a) Infezione della ferita chirurgica
 - b) Malnutrizione
 - c) Ritenzione urinaria
 - d) Nessuna delle risposte
5. **Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:**
 - a) Prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con la persona assistita
 - b) Prima di procedure invasive
 - c) Come preparazione alle attività di strumentazione perioperatoria
 - d) Al termine delle attività di strumentazione perioperatoria
6. **Con quale modalità viene classificato il grado di gravità/priorità di un paziente che accede al Pronto Soccorso?**
 - a) Attraverso l'attribuzione di un codice colore o numerico
 - b) Attraverso la consegna di un numero progressivo in relazione all'arrivo del paziente
 - c) Attraverso la disponibilità del personale sanitario nelle sale visita
 - d) Attraverso i dati che l'infermiere rileva nella documentazione del paziente
7. **Quali ausili ergonomici l'infermiere deve utilizzare nello spostamento letto-carrozzina di un paziente totalmente dipendente?**
 - a) Il sollevatore con imbragatura, per non correre rischi di caduta della persona
 - b) Il disco girevole e le cinture ergonomiche, per conservare e potenziare le capacità residue della persona, mantenendo un elevato livello di sicurezza
 - c) La cintura ergonomica
 - d) I teli antiatrito, perché favoriscono lo scivolamento della persona, dal bordo del letto alla carrozzina

8. **Con il termine emiplegia si intende:**
- a) Una paralisi o deficit completo di forza di un lato del corpo dovuta ad una lesione nel lato opposto del cervello
 - b) Uno stato di debolezza di un lato del corpo dovuto ad una lesione nell'emisfero opposto
 - c) La resistenza offerta allo stiramento passivo del muscolo
 - d) Un deficit parziale di forza degli arti inferiori
9. **Quali caratteristiche deve presentare il sistema di confezionamento del materiale sterile?**
- a) Il viraggio di colore degli indicatori di sterilità, in presenza della data di sterilizzazione
 - b) L'integrità della confezione, il codice dell'operatore che ha eseguito la sterilizzazione, la data di scadenza
 - c) L'integrità della confezione, il viraggio di colore degli indicatori di sterilità, la data di scadenza sulla confezione.
 - d) Solo la data di scadenza
10. **Qual è lo scopo della valutazione pre-operatoria?**
- a) Prevenire le complicanze post operatorie
 - b) Pianificare la preparazione del paziente all'intervento
 - c) Identificare il paziente a rischio di complicanze anestesologiche
 - d) Tutte le risposte sono corrette
11. **Per melena si intende:**
- a) L'emissione dal retto di sangue rosso vivo
 - b) La contrazione spasmodica dello sfintere anale con il bisogno persistente di defecare con poca o assente produzione di feci
 - c) L'eccessiva presenza di gas nel lume intestinale che determina la distensione delle pareti e la fuoriuscita del gas (flato) dall'ano
 - d) L'emissione di feci nere dal retto, di aspetto piceo e maleodoranti, di consistenza poltacea
12. **Quali sono le scale più comunemente utilizzate per la valutazione del dolore:**
- a) CONLEY
 - b) VAS; VDS; NRS
 - c) BRADEN
 - d) NORTON
13. **Per pollachiuria si intende:**
- a) La perdita involontaria di urina
 - b) L'elevata frequenza di minzioni
 - c) L'eccessiva quantità di urina prodotta
 - d) La minzione difficoltosa o dolorosa
14. **Qual è il veicolo di trasmissione più frequente delle infezioni ospedaliere?**
- a) Saliva
 - b) Mani
 - c) Trasfusioni
 - d) Liquidi biologici
15. **In relazione all'uso dei guanti quale affermazione è errata?**
- a) Occorre utilizzare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso
 - b) L'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani
 - c) Occorre tenere i guanti non sterili durante l'igiene dei pazienti
 - d) Occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario
16. **Il signor CF deve eseguire una puntura lombare. Quale complicanza potrà comunemente manifestare?**
- a) Sonnolenza

- b) Cefalea
c) Vomito
d) Dolore toracico
17. **Quali scelte sono indicate nel posizionamento del catetere vescicale a permanenza?**
a) Scelta del calibro del catetere in relazione all'età del paziente
 b) Scelta di un catetere del minor calibro possibile e utilizzo di sacca a circuito chiuso
c) Scelta di un catetere di calibro non inferiore a 20 Ch al fine di favorire una buona diuresi
d) Scelta di un catetere di piccolo calibro e sistema a circuito aperto al fine di favorire una buona diuresi
18. **In base alle più recenti raccomandazioni sulla prevenzione delle infezioni associate alla presenza di catetere intravascolare, come deve essere gestita la medicazione di inserzione del catetere venoso periferico (CVP)?**
 a) Utilizzare una medicazione sterile, semipermeabile e trasparente per coprire il sito di inserzione del CVP
b) Utilizzare acqua ossigenata per la medicazione e medicare a piatto
c) Utilizzare una pomata antibiotica sul sito di inserzione e coprire con medicazione sterile
d) Utilizzare soluzioni a base di iodofori e coprire con cerotto medicato
19. **Cosa si intende per effetti collaterali di un farmaco:**
 a) Gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
b) Gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
c) Gli effetti farmacologici non desiderati e non prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
d) Gli effetti tossici provocati da scorretta somministrazione del farmaco
20. **Da che cosa è provocata la scabbia?**
 a) Da un acaro
b) Da un virus
c) Da un batterio
d) Da un prione
21. **Le lesioni da pressione necessitano di una detersione routinaria. E' raccomandato pertanto l'utilizzo di:**
a) Disinfettanti a base di iodopovidone
 b) Soluzione fisiologica
c) Clorexidina
d) Sali di Ammonio Quaternario
22. **La persona assistita a cui va eseguito un clisma fleet deve assumere posizione:**
 a) Laterale sinistra con arto flesso
b) Laterale destra con arto flesso
c) Genu-pettorale
d) Prona
23. **La riduzione del rischio infettivo in Unità di Terapia Intensiva si fonda sul rispetto di determinate norme igieniche tra cui:**
 a) Lavaggio frequente delle mani del personale sanitario
b) Profilassi anti-micotica a tutti i pazienti ricoverati
c) Posizionamento di CVC a tutti i pazienti ricoverati
d) Profilassi antibiotica ad ampio spettro al momento del ricovero
24. **Quale dei seguenti cateteri vescicali è semirigido e ha un'angolatura di 30°?**
 a) Tiemann
b) Foley

- c) Nelaton
 - d) Nessuno dei precedenti
25. **Al fine di prevenire lo sviluppo di lesioni da pressione nei soggetti a rischio è importante:**
- a) Ridurre al minimo frizione e attrito sulla superficie di appoggio della cute
 - b) Effettuare le mobilizzazioni trascinando il paziente sulle lenzuola
 - c) Ridurre la frequenza dell'igiene perineale in caso di incontinenza fecale
 - d) Ridurre al minimo frizione e attrito sulla superficie di appoggio della cute e favorire la mobilizzazione precoce
26. **Nei pazienti in degenza protratta, la scala di Braden:**
- a) Dovrebbe essere rivalutata almeno una volta ogni due settimane
 - b) Dovrebbe essere rivalutata soltanto una volta al mese
 - c) Dovrebbe essere rivalutata ogni sette giorni, ogni qualvolta le condizioni del paziente si modificano e alla dimissione
 - d) In previsione del trasferimento del paziente ad altro reparto e prima della dimissione
27. **Nell'esecuzione della clearance creatinica delle 24 ore, il paziente nel raccogliere le urine deve:**
- a) Includere la minzione di inizio della raccolta e tutte le successive compresa quella di chiusura della raccolta
 - b) Includere la minzione di inizio raccolta e tutte le successive esclusa quella di chiusura della raccolta
 - c) Escludere la minzione di inizio raccolta e includere tutte le successive compresa quella di chiusura della raccolta
 - d) Escludere la minzione di inizio raccolta e includere tutte le successive esclusa quella di chiusura della raccolta
28. **In caso di pneumotorace iperteso, per quale manovra salvavita occorre predisporre il materiale?**
- a) Per il posizionamento di un drenaggio toracico
 - b) Per eseguire una fasciatura del torace con bendaggio tipo Desault
 - c) Per eseguire l'intubazione oro tracheale
 - d) Per eseguire broncoscopia
29. **Con quale Legge è stato abrogato il mansionario dell'infermiere?**
- a) DM. 739/94
 - b) L. 42/99
 - c) L. 251/2000
 - d) Legge 43/2006
30. **Quale normativa definisce l'obbligo di iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche?**
- a) Legge 43/2006
 - b) L. 251/2000
 - c) DM 739/94
 - d) L.42/99

AZIENDA REGIONALE A.S.L. "NO"
 (sede legale: Viale Roma, 7 – 28100 NOVARA)


**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI
 DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO/INFERMIERE CAT. D**

PROVA SCRITTA N. 2

1. **Dovendo eseguire la medicazione di una ferita chirurgica quali tra i seguenti passaggi occorre attuare:**
 - a) Rimozione della medicazione, detersione, valutazione, antisepsi della ferita e scelta della "nuova" medicazione da applicare
 - b) Rimozione della medicazione, detersione della ferita e scelta della "nuova" medicazione da applicare
 - c) Valutazione, disinfezione della ferita e scelta della medicazione
 - d) Nessuna delle risposte
2. **Quale documentazione deve necessariamente "accompagnare" il paziente in sala operatoria?**
 - a) Consenso informato
 - b) Prove di funzionalità respiratorie
 - c) TAC total body
 - d) Nessuna delle risposte
3. **Un'adeguata cura del piede diabetico comprende:**
 - a) Utilizzo di calzature adatte
 - b) Corretto taglio delle unghie
 - c) Mantenimento della cute ben idratata
 - d) Tutte le risposte sono corrette
4. **Per infezione correlata ai processi assistenziali si intende:**
 - a) Un'infezione insorta durante il ricovero in ospedale, clinicamente non manifesta, né in incubazione al momento dell'ammissione; si sviluppa almeno 48-72 ore dopo il ricovero
 - b) Un'infezione che si manifesta durante il ricovero ospedaliero, ma che era già in incubazione al momento del ricovero
 - c) Un'infezione contratta durante il ricovero, ma risolta prima della dimissione
 - d) Un'infezione che si manifesta alla dimissione e che necessita necessariamente di un nuovo ricovero
5. **Quali, tra i seguenti segni e sintomi, sono attribuibili alla ritenzione acuta di urina nel post-operatorio?**
 - a) Ematuria, febbre, ipotensione
 - b) Nicturia, febbre, ipertensione
 - c) Dolore addominale, contrazione delle diuresi, presenza di globo vescicale
 - d) Dolore, aumento della diuresi, tachicardia
6. **Quali sono i principali segni dello shock ipovolemico?**
 - a) Diaforesi e desaturazione
 - b) Cianosi, bradicardia e ipertensione
 - c) Dispnea, ipotensione e bradicardia
 - d) Stato di agitazione, tachicardia e ipotensione
7. **In un paziente con pneumotorace risulta fondamentale controllare:**



- a) Il drenaggio toracico
 - b) La pressione arteriosa
 - c) La diuresi
 - d) Il bilancio idroelettrico
8. **Dovendo istruire il personale di supporto all'esecuzione della Tricotomia quali indicazioni occorre fornire?**
- a) Area precisa da radere, utilizzo del rasoio a lama, il tempo di esecuzione dalle 4 alle 6 ore prima che il paziente vada in sala operatoria
 - b) Area precisa da radere, utilizzo del clipper, il tempo di esecuzione 2/3 ore prima che il paziente vada in sala operatoria
 - c) Area precisa da radere, utilizzo del clipper, il tempo di esecuzione 24/36 ore prima che il paziente vada in sala operatoria
 - d) Nessuna delle informazioni precedenti è corretta
9. **Che cosa si intende per disinfezione:**
- a) Processo utilizzato per eliminare i microrganismi potenzialmente patogeni presenti sulla superficie di un oggetto, ad esclusione delle spore
 - b) Processo di rimozione meccanica dello sporco da superfici, oggetti, cute o mucose
 - c) Processo utilizzato per ridurre il numero di organismi patogeni potenzialmente presenti sulla superficie di un oggetto
 - d) Processo di distruzione assoluta di tutti i microrganismi, comprese le spore.
10. **Quale tra i seguenti prodotti è indicato nell'antisepsi di una ferita?**
- a) Iodopovidone in soluzione acquosa
 - b) Alcool etilico
 - c) Iodopovidone in soluzione alcolica
 - d) Polifenoli e Sali di Ammonio Quaternario
11. **Il bilancio idrico è un insieme di processi che consentono di:**
- a) Bilanciare l'assunzione e la perdita di liquidi nel corso delle 24 ore
 - b) Valutare solo le entrate di liquidi a intervalli regolari
 - c) Bilanciare l'assunzione e la perdita di liquidi nel corso delle 12 ore
 - d) Valutare solo le perdite di liquidi nel corso delle 12 ore
12. **In caso di caduta di un paziente il personale medico ed infermieristico in servizio al momento dell'evento dovrà compilare la scheda di Incident Reporting aziendale:**
- a) Solo in caso di cadute potenzialmente prevedibili
 - b) Sempre
 - c) Solo se la caduta comporta una responsabilità diretta dell'operatore sanitario presente al momento dell'evento
 - d) Solo in caso di morte o grave danno del paziente
13. **La scala di Conley è uno strumento utilizzato per:**
- a) La valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana
 - b) La predizione del rischio di lesione da decubito
 - c) La predizione del rischio di malnutrizione
 - d) La predisposizione del rischio di caduta
14. **L'infermiere dà le seguenti indicazioni a un utente che deve eseguire una urinocoltura**
- a) Le urine vanno raccolte nelle 24 ore
 - b) Le urine vanno raccolte la sera prima
 - c) Le urine devono essere raccolte in un recipiente sterile dopo aver lavato i genitali esterni raccogliendo il mitto intermedio
 - d) Le urine devono essere raccolte al mattino in un recipiente sterile dopo aver lavato i genitali esterni
15. **Nella preparazione pre-operatoria del paziente vanno applicate le seguenti raccomandazioni:**



- a) Assunzione di liquidi fino a trenta minuti prima dell'intervento
 - b) Uso della tricotomia il giorno precedente l'intervento
 - c) Doccia pre-operatoria con antisettico
 - d) Tricotomia preferibilmente con rasoio a lametta
- 16. Il decreto legislativo 81/2008 si applica:**
- a) Solo ai settori privati
 - b) Solo ai settori pubblici con tipologia di lavoro a rischio
 - c) Solo ai settori privati con tipologie di lavoro a rischio
 - d) A tutti i settori lavorativi
- 17. Un corretto utilizzo dei guanti:**
- a) Protegge i pazienti dalle infezioni ed elimina la necessità di lavare le mani
 - b) Protegge le mani dalla disidratazione e dall'insorgenza di allergie conseguenti all'uso insistente di agenti chimici
 - c) Può ridurre il rischio di contrarre e/o trasmettere malattie infettive e protegge dal contatto con agenti chimici, fisici e biologici
 - d) Protegge le mani dalla disidratazione e dall'insorgenza di allergie conseguenti all'uso insistente di antisettici
- 18. Lo smaltimento di aghi e taglienti viene effettuato:**
- a) In contenitori in propilene rigido imperforabili ed impermeabili
 - b) In contenitori di cartone rigido impermeabili
 - c) In contenitori per smaltimento di materiale biologico
 - d) In contenitori a tenuta semirigidi
- 19. In riferimento alla cateterizzazione vescicale a permanenza, è indicato scegliere cateteri:**
- a) Dispositivi a tre vie per eseguire esami uro-dinamici e colturali in sicurezza
 - b) In silicone o rivestiti in silicone in caso di tenuta in situ per lunghi periodi
 - c) Dispositivi in lattice in caso di tenuta in situ per lunghi periodi
 - d) Dispositivi in silicone, privi di sistema di ancoraggio, se prevista permanenza per lunghi periodi
- 20. Quale delle seguenti affermazioni rispetto alla gestione del cateterismo vescicale NON è corretta?**
- a) Tenere sacca di drenaggio e tubo lontano dal pavimento
 - b) Fissare il catetere alla coscia
 - c) Utilizzare il catetere appropriato con il calibro più grande
 - d) Impiegare sistemi di drenaggio a circuito chiuso
- 21. Tra le seguenti affermazioni relative alle linee guida per il trattamento della PONV (nausea e vomito post-operatorio), quale affermazione è corretta?**
- a) Far assumere precocemente molti liquidi per via naturale
 - b) Far assumere precocemente la posizione prona
 - c) Far assumere posizione semiseduta
 - d) Valutare il livello di rischio della persona assistita
- 22. La posizione più idonea per la somministrazione di un clistere evacuativo a piccolo volume è:**
- a) Laterale destra con ginocchio sinistro flesso (posizione di Simd)
 - b) Laterale sinistra con ginocchio destro flesso (posizione di Sims)
 - c) Genu-pettorale
 - d) Prona
- 23. Quale fra le seguenti sostanze NON è un disinfettante?**
- a) Soluzione di cloruro di sodio al 9%
 - b) Perossido di idrogeno
 - c) Benzalconio cloruro
 - d) Clorexidina



24. **Quale delle seguenti possono essere segni e/o sintomi di ipossiemia?**
- a) Prurito, sonnolenza, vertigine
 - b) Diaforesi e coma
 - c) Cianosi, tachicardia, turbe neurologiche, coma, stupor, encefalopatia ipercapnica, turbe della coscienza
 - d) Cianosi, coma, stupor, encefalopatia ipercapnica, turbe della coscienza
25. **Nel caso di nutrizione parenterale totale, quali complicanze possono presentarsi?**
- a) Settiche
 - b) Meccaniche
 - c) Metaboliche
 - d) Tutte le risposte sono corrette
26. **In un paziente portatore di drenaggio addominale in seguito ad intervento chirurgico, cosa deve monitorare l'infermiere?**
- a) Sede e tipologia del drenaggio, corretto funzionamento, quantità e qualità del liquido drenato
 - b) Sede e tipologia del drenaggio
 - c) Corretto funzionamento del drenaggio e dolore
 - d) Nessuna delle precedenti
27. **Nell'esecuzione della clearance creatinica delle 24 ore, il paziente nel raccogliere le urine deve:**
- a) Includere la minzione di inizio della raccolta e tutte le successive compresa quella di chiusura della raccolta
 - b) Includere la minzione di inizio raccolta e tutte le successive esclusa quella di chiusura della raccolta
 - c) Escludere la minzione di inizio raccolta e includere tutte le successive compresa quella di chiusura della raccolta
 - d) Escludere la minzione di inizio raccolta e includere tutte le successive esclusa quella di chiusura della raccolta
28. **Di che colore sono le feci acoliche?**
- a) Bianco
 - b) Grigio
 - c) Nero
 - d) Verdastro
29. **Quale normativa definisce l'obbligo di iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche?**
- a) Legge 43/2006
 - b) L. 251/2000
 - c) DM 739/94
 - d) L.42/99
30. **Quale normativa definisce il Profilo Professionale dell'Infermiere?**
- a) DM 739/94
 - b) L. 251/2000
 - c) Legge 43/2006
 - d) L. 42/99



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO/INFERMIERE
CAT. D

PROVA SCRITTA N. 2

1. **Dovendo eseguire la medicazione di una ferita chirurgica quali tra i seguenti passaggi occorre attuare:**
 - a) Rimozione della medicazione, detersione, valutazione, antisepsi della ferita e scelta della "nuova" medicazione da applicare
 - b) Rimozione della medicazione, detersione della ferita e scelta della "nuova" medicazione da applicare
 - c) Valutazione, disinfezione della ferita e scelta della medicazione
 - d) Nessuna delle risposte
2. **Quale documentazione deve necessariamente "accompagnare" il paziente in sala operatoria?**
 - a) Consenso informato
 - b) Prove di funzionalità respiratorie
 - c) TAC total body
 - d) Nessuna delle risposte
3. **Un'adeguata cura del piede diabetico comprende:**
 - a) Utilizzo di calzature adatte
 - b) Corretto taglio delle unghie
 - c) Mantenimento della cute ben idratata
 - d) Tutte le risposte sono corrette
4. **Per infezione correlata ai processi assistenziali si intende:**
 - a) Un'infezione insorta durante il ricovero in ospedale, clinicamente non manifesta, né in incubazione al momento dell'ammissione; si sviluppa almeno 48-72 ore dopo il ricovero
 - b) Un'infezione che si manifesta durante il ricovero ospedaliero, ma che era già in incubazione al momento del ricovero
 - c) Un'infezione contratta durante il ricovero, ma risolta prima della dimissione
 - d) Un'infezione che si manifesta alla dimissione e che necessita necessariamente di un nuovo ricovero
5. **Quali, tra i seguenti segni e sintomi, sono attribuibili alla ritenzione acuta di urina nel post-operatorio?**
 - a) Ematuria, febbre, ipotensione
 - b) Nicturia, febbre, ipertensione
 - c) Dolore addominale, contrazione delle diuresi, presenza di globo vescicale
 - d) Dolore, aumento della diuresi, tachicardia
6. **Quali sono i principali segni dello shock ipovolemico?**
 - a) Diaforesi e desaturazione
 - b) Cianosi, bradicardia e ipertensione
 - c) Dispnea, ipotensione e bradicardia
 - d) Stato di agitazione, tachicardia e ipotensione
7. **In un paziente con pneumotorace risulta fondamentale controllare:**
 - a) Il drenaggio toracico
 - b) La pressione arteriosa
 - c) La diuresi
 - d) Il bilancio idroelettrico

8. **Dovendo istruire il personale di supporto all'esecuzione della Tricotomia quali indicazioni occorre fornire?**
- a) Area precisa da radere, utilizzo del rasoio a lama, il tempo di esecuzione dalle 4 alle 6 ore prima che il paziente vada in sala operatoria
 - b) Area precisa da radere, utilizzo del clipper, il tempo di esecuzione 2/3 ore prima che il paziente vada in sala operatoria
 - c) Area precisa da radere, utilizzo del clipper, il tempo di esecuzione 24/36 ore prima che il paziente vada in sala operatoria
 - d) Nessuna delle informazioni precedenti è corretta
9. **Che cosa si intende per disinfezione:**
- a) Processo utilizzato per eliminare i microrganismi potenzialmente patogeni presenti sulla superficie di un oggetto, ad esclusione delle spore
 - b) Processo di rimozione meccanica dello sporco da superfici, oggetti, cute o mucose
 - c) Processo utilizzato per ridurre il numero di organismi patogeni potenzialmente presenti sulla superficie di un oggetto
 - d) Processo di distruzione assoluta di tutti i microrganismi, comprese le spore.
10. **Quale tra i seguenti prodotti è indicato nell'antisepsi di una ferita?**
- a) Iodopovidone in soluzione acquosa
 - b) Alcool etilico
 - c) Iodopovidone in soluzione alcolica
 - d) Polifenoli e Sali di Ammonio Quaternario
11. **Il bilancio idrico è un insieme di processi che consentono di:**
- a) Bilanciare l'assunzione e la perdita di liquidi nel corso delle 24 ore
 - b) Valutare solo le entrate di liquidi a intervalli regolari
 - c) Bilanciare l'assunzione e la perdita di liquidi nel corso delle 12 ore
 - d) Valutare solo le perdite di liquidi nel corso delle 12 ore
12. **In caso di caduta di un paziente il personale medico ed infermieristico in servizio al momento dell'evento dovrà compilare la scheda di Incident Reporting aziendale:**
- a) Solo in caso di cadute potenzialmente prevedibili
 - b) Sempre
 - c) Solo se la caduta comporta una responsabilità diretta dell'operatore sanitario presente al momento dell'evento
 - d) Solo in caso di morte o grave danno del paziente
13. **La scala di Conley è uno strumento utilizzato per:**
- a) La valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana
 - b) La predizione del rischio di lesione da decubito
 - c) La predizione del rischio di malnutrizione
 - d) La predisposizione del rischio di caduta
14. **L'infermiere dà le seguenti indicazioni a un utente che deve eseguire una urinocoltura**
- a) Le urine vanno raccolte nelle 24 ore
 - b) Le urine vanno raccolte la sera prima
 - c) Le urine devono essere raccolte in un recipiente sterile dopo aver lavato i genitali esterni raccogliendo il mitto intermedio
 - d) Le urine devono essere raccolte al mattino in un recipiente sterile dopo aver lavato i genitali esterni
15. **Nella preparazione pre-operatoria del paziente vanno applicate le seguenti raccomandazioni:**
- a) Assunzione di liquidi fino a trenta minuti prima dell'intervento
 - b) Uso della tricotomia il giorno precedente l'intervento
 - c) Doccia pre-operatoria con antisettico
 - d) Tricotomia preferibilmente con rasoio a lametta
16. **Il decreto legislativo 81/2008 si applica:**

- a) Solo ai settori privati
 - b) Solo ai settori pubblici con tipologia di lavoro a rischio
 - c) Solo ai settori privati con tipologie di lavoro a rischio
 - d) A tutti i settori lavorativi
17. **Un corretto utilizzo dei guanti:**
- a) Protegge i pazienti dalle infezioni ed elimina la necessità di lavare le mani
 - b) Protegge le mani dalla disidratazione e dall'insorgenza di allergie conseguenti all'uso insistente di agenti chimici
 - c) Può ridurre il rischio di contrarre e/o trasmettere malattie infettive e protegge dal contatto con agenti chimici, fisici e biologici
 - d) Protegge le mani dalla disidratazione e dall'insorgenza di allergie conseguenti all'uso insistente di antisettici
18. **Lo smaltimento di aghi e taglienti viene effettuato:**
- a) In contenitori in propilene rigido impermeabili ed impermeabili
 - b) In contenitori di cartone rigido impermeabili
 - c) In contenitori per smaltimento di materiale biologico
 - d) In contenitori a tenuta semirigidi
19. **In riferimento alla cateterizzazione vescicale a permanenza, è indicato scegliere cateteri:**
- a) Dispositivi a tre vie per eseguire esami uro-dinamici e colturali in sicurezza
 - b) In silicone o rivestiti in silicone in caso di tenuta in situ per lunghi periodi
 - c) Dispositivi in lattice in caso di tenuta in situ per lunghi periodi
 - d) Dispositivi in silicone, privi di sistema di ancoraggio, se prevista permanenza per lunghi periodi
20. **Quale delle seguenti affermazioni rispetto alla gestione del cateterismo vescicale NON è corretta?**
- a) Tenere sacca di drenaggio e tubo lontano dal pavimento
 - b) Fissare il catetere alla coscia
 - c) Utilizzare il catetere appropriato con il calibro più grande
 - d) Impiegare sistemi di drenaggio a circuito chiuso
21. **Tra le seguenti affermazioni relative alle linee guida per il trattamento della PONV (nausea e vomito post-operatorio), quale affermazione è corretta?**
- a) Far assumere precocemente molti liquidi per via naturale
 - b) Far assumere precocemente la posizione prona
 - c) Far assumere posizione semiseduta
 - d) Valutare il livello di rischio della persona assistita
22. **La posizione più idonea per la somministrazione di un clistere evacuativo a piccolo volume è:**
- a) Laterale destra con ginocchio sinistro flesso (posizione di Simd)
 - b) Laterale sinistra con ginocchio destro flesso (posizione di Sims)
 - c) Genu-pettorale
 - d) Prona
23. **Quale fra le seguenti sostanze NON è un disinfettante?**
- a) Soluzione di cloruro di sodio al 9%
 - b) Perossido di idrogeno
 - c) Benzalconio cloruro
 - d) Clorexidina
24. **Quale delle seguenti possono essere segni e/o sintomi di ipossiemia?**
- a) Prurito, sonnolenza, vertigine
 - b) Diaforesi e coma
 - c) Cianosi, tachicardia, turbe neurologiche, coma, stupor, encefalopatia ipercapnica, turbe della coscienza

- d) Cianosi, coma, stupor, encefalopatia ipercapnica, turbe della coscienza
25. **Nel caso di nutrizione parenterale totale, quali complicanze possono presentarsi?**
- a) Settiche
 - b) Meccaniche
 - c) Metaboliche
 - d) Tutte le risposte sono corrette
26. **In un paziente portatore di drenaggio addominale in seguito ad intervento chirurgico, cosa deve monitorare l'infermiere?**
- a) Sede e tipologia del drenaggio, corretto funzionamento, quantità e qualità del liquido drenato
 - b) Sede e tipologia del drenaggio
 - c) Corretto funzionamento del drenaggio e dolore
 - d) Nessuna delle precedenti
27. **Nell'esecuzione della clearance creatinica delle 24 ore, il paziente nel raccogliere le urine deve:**
- a) Includere la minzione di inizio della raccolta e tutte le successive compresa quella di chiusura della raccolta
 - b) Includere la minzione di inizio raccolta e tutte le successive esclusa quella di chiusura della raccolta
 - c) Escludere la minzione di inizio raccolta e includere tutte le successive compresa quella di chiusura della raccolta
 - d) Escludere la minzione di inizio raccolta e includere tutte le successive esclusa quella di chiusura della raccolta
28. **Di che colore sono le feci acoliche?**
- a) Bianco
 - b) Grigio
 - c) Nero
 - d) Verdastro
29. **Quale normativa definisce l'obbligo di iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche?**
- a) Legge 43/2006
 - b) L. 251/2000
 - c) DM 739/94
 - d) L.42/99
30. **Quale normativa definisce il Profilo Professionale dell'Infermiere?**
- a) DM 739/94
 - b) L. 251/2000
 - c) Legge 43/2006
 - d) L. 42/99

PROVA SCRITTA

PM

AZIENDA REGIONALE A.S.L. "NO"
(sede legale: Viale Roma, 7 – 28100 NOVARA)

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO/INFERMIERE CAT. D

PROVA SCRITTA N. 3

1. **Dopo qualche ora dall'intervento chirurgico il paziente si presenta confuso, agitato e pallido. Quali tra le seguenti azioni risultano essere corrette?**
 - a) Chiamare subito il medico ed attendere le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche
 - b) Valutare lo stato di coscienza, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, controllare eventuali drenaggi, la medicazione della ferita e informare il medico
 - c) Valutare lo stato di coscienza, eseguire un prelievo ematico venoso per controllare il valore della glicemia, dell'emocromo e il tempo di coagulazione e chiamare il medico
 - d) Valutare lo stato di coscienza, tranquillizzare il paziente, spiegare che è solo l'effetto dell'anestesia e che il medico passerà in reparto al più presto
2. **Quale, tra le seguenti, è un'indicazione al posizionamento del catetere vescicale durante un intervento chirurgico?**
 - a) Necessità di mantenere la vescica vuota
 - b) Prevenire le infezioni alle vie urinarie
 - c) Aumentare la diuresi nel post operatorio
 - d) Diminuire il rischio di ematuria
3. **Quali, tra le seguenti, rappresentano segni e sintomi di infezione della ferita chirurgica?**
 - a) Rossore, edema, ipotermia
 - b) Rossore, dolore, cianosi cutanea
 - c) Rossore, dolore, presenza di essudato, edema, calore
 - d) Nessuna delle risposte
4. **L'apertura chirurgica delle cavità addominale si definisce:**
 - a) Toracotomia
 - b) Sternotomia
 - c) Lobotomia
 - d) Laparotomia
5. **Ai sensi del D.Lgs 81/08, la formazione dei lavoratori deve avvenire:**
 - a) Entro un anno dall'assunzione, dal trasferimento o cambiamento di mansioni, dall'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
 - b) In occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
 - c) Almeno 30 giorni prima dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro e di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi
 - d) Dipende dalla singola Azienda Sanitaria
6. **Cosa si intende con la sigla DPI di cui all'Art 74 del D.Lgs 81/08?**
 - a) Dispositivi di Protezione Individuale
 - b) Dispositivi di Prevenzione Individuali
 - c) Dispositivi di Protezione Indispensabili



PM

PM

- d) Dispositivo di Precauzione Indispensabile
7. **Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle Infezioni Correlate ai Processi Assistenziali?**
- Il lavaggio delle mani
 - La dotazione di disinfettanti e antibiotici
 - L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti
 - Il ricambio della biancheria da letto
8. **Le restrizioni legate all'assunzione di cibi o liquidi nel pre-operatorio sono finalizzate a:**
- Evitare l'ipotermia
 - Prevenire il rischio di inalazione
 - Evitare l'iperglicemia durante l'intervento chirurgico
 - Ridurre il rischio emorragico
9. **Cosa s'intende per vigilanza e sorveglianza nell'immediato post-operatorio?**
- La periodica valutazione dello stato di coscienza, della funzione respiratoria, cardiocircolatoria, della diuresi, dei drenaggi, della temperatura e del dolore
 - La periodica valutazione della funzionalità renale ed epatica attraverso l'esecuzione di un prelievo ematico
 - La periodica valutazione del monitor e della diuresi al fine di evitare potenziale ritenzione acuta d'urine
 - La periodica valutazione dello stato di coscienza, della funzione respiratoria, cardiocircolatoria, della diuresi, dei drenaggi e della temperatura
10. **Quale normativa definisce l'obbligo di iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche?**
- Legge 43/2006
 - L. 251/2000
 - DM 739/94
 - L.42/99
11. **Quale normativa definisce il Profilo Professionale dell'Infermiere?**
- DM 739/94
 - L. 251/2000
 - Legge 43/2006
 - L. 42/99
12. **Quali fra le seguenti misure di prevenzione si sono dimostrate particolarmente efficaci nel ridurre l'incidenza di infezione delle vie urinarie catetere correlate:**
- Lavaggi vescicali quotidiani
 - L'adozione di un sistema di drenaggio a circuito chiuso
 - L'effettuazione di ginnastica vescicale ogni 4 ore
 - Sostituzione adottando tecnica sterile del catetere vescicale ogni 3 giorni
13. **Quali fra le seguenti è una modalità corretta per identificare un assistito:**
- Ripetere all'assistito il suo nome, cognome così che possa confermare la correttezza
 - Far indossare un braccialetto identificativo inamovibile riportante nome, cognome e data di nascita dell'assistito
 - Apporre il nome dell'assistito sulla testata del letto, sul comodino o all'ingresso della stanza di degenza
 - Affidarsi alla presenza di parenti o famigliari a noi noti
14. **L'assistenza alla persona in ossigenoterapia prevede:**
- L'educazione della persona ad una corretta igiene orale e delle narici
 - Una corretta umidificazione del flusso di aria per prevenire la secchezza della mucosa nasale



- c) Il controllo dell'integrità cutanea delle zone a contatto con il presidio di somministrazione
d) Tutte le risposte sono corrette
15. **Perché è necessario posizionare in scarico l'arto immobilizzato con apparecchio gessato?**
a) Per evitare infezioni
b) Per prevenire la macerazione della cute
c) Per favorire il ritorno venoso e prevenire l'edema
d) Per accelerare la guarigione
16. **La scala di Braden:**
a) Analizza dieci variabili che descrivono l'autonomia nelle attività di vita quotidiana
b) Analizza sei fattori che descrivono le condizioni di vita del paziente anziano
c) Analizza sei fattori per valutare il rischio di insorgenza di lesioni da pressione
d) Analizza sette variabili che descrivono il rischio di insorgenza di lesioni da grattamento
17. **Definizione di un evento che potenzialmente avrebbe potuto dar luogo ad un incidente ma che un intervento correttivo dell'operatore ha evitato:**
a) Near missing event
b) Incident reporting
c) Role playing
d) Evento avverso
18. **L'infermiere dà le seguenti indicazioni a un utente che deve eseguire una urinocoltura**
a) Le urine vanno raccolte nelle 24 ore
b) Le urine vanno raccolte la sera prima
c) Le urine devono essere raccolte in un recipiente sterile dopo aver lavato i genitali esterni raccogliendo il mitto intermedio
d) Le urine devono essere raccolte al mattino in un recipiente sterile dopo aver lavato i genitali esterni
19. **Per verificare l'affidabilità dell'autoclave a vapore con il controllo giornaliero si utilizza:**
a) Il test di Johnson
b) Il test Dark Blue
c) Il test prova secondo metodo rapido e biologico
d) Il test Bowie-Dick
20. **Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da:**
a) Batteri
b) Virus respiratori
c) Protozoi
d) Miceti
21. **La registrazione della frequenza respiratoria prevede:**
a) La misurazione e la trascrizione degli atti respiratori compiuti dalla persona ogni 30 secondi
b) La registrazione delle caratteristiche del respiro
c) La valutazione degli atti respiratori compiuti dalla persona
d) La registrazione degli atti respiratori compiuti dalla persona in un minuto
22. **Quale dei seguenti NON è un fattore favorente le infezioni nosocomiali?**
a) Il reparto di terapia intensiva (tipologia delle patologie ospitate)
b) L'impiego di farmaci immunosoppressori o citostatici
c) La presenza di dispositivi invasivi (CVP, CVC, CV, Ecc.)
d) L'utilizzo di materiale sterile monouso
23. **Quali caratteristiche deve presentare confezionamento del materiale sterile?**
a) Il viraggio di colore degli indicatori di sterilità, data di sterilizzazione



- b) L'integrità della confezione, il codice dell'operatore che ha eseguito la sterilizzazione, la data di scadenza
 - c) L'integrità della confezione, il viraggio di colore degli indicatori di sterilità, la data di scadenza sulla confezione.
 - d) Solo la data di scadenza
- 24. In un paziente portatore di drenaggio addominale in seguito ad intervento chirurgico, cosa deve monitorare l'infermiere?**
- a) Sede e tipologia del drenaggio, corretto funzionamento, quantità e qualità del liquido drenato
 - b) Sede e tipologia del drenaggio
 - c) Corretto funzionamento del drenaggio e dolore
 - d) Nessuna delle precedenti
- 25. Nel caso di nutrizione parenterale totale, quali complicanze possono presentarsi?**
- a) Settiche
 - b) Meccaniche
 - c) Metaboliche
 - d) Tutte le risposte sono corrette
- 26. Di che colore sono le feci acoliche?**
- a) Bianco
 - b) Grigio
 - c) Nero
 - d) Verdastro
- 27. Le lesioni da pressione necessitano di una detersione routinaria. E' raccomandato pertanto l'utilizzo di:**
- a) Disinfettanti a base di iodopovidone
 - b) Soluzione fisiologica
 - c) Clorexidina
 - d) Sali di Ammonio Quaternario
- 28. Nell'esecuzione della clearance creatinica delle 24 ore, il paziente nel raccogliere le urine deve:**
- a) Includere la minzione di inizio della raccolta e tutte le successive compresa quella di chiusura della raccolta
 - b) Includere la minzione di inizio raccolta e tutte le successive esclusa quella di chiusura della raccolta
 - c) Escludere la minzione di inizio raccolta e includere tutte le successive compresa quella di chiusura della raccolta
 - d) Escludere la minzione di inizio raccolta e includere tutte le successive esclusa quella di chiusura della raccolta
- 29. La scala di Conley è uno strumento utilizzato per:**
- a) La valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana
 - b) La predizione del rischio di lesione da decubito
 - c) La predizione del rischio di malnutrizione
 - d) La predisposizione del rischio di caduta
- 30. Con quale modalità viene classificato il grado di gravità/priorità di un paziente che accede al Pronto Soccorso?**
- a) Attraverso l'attribuzione di un codice colore o numerico
 - b) Attraverso la consegna di un numero progressivo in relazione all'arrivo del paziente
 - c) Attraverso la disponibilità del personale sanitario nelle sale visita
 - d) Attraverso i dati che l'infermiere rileva nella documentazione del paziente



RISPOSTE CORRETTE

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI N. 5 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO/INFERMIERE CAT. D

PROVA SCRITTA N. 3

1. **Dopo qualche ora dall'intervento chirurgico il paziente si presenta confuso, agitato e pallido. Quali tra le seguenti azioni risultano essere corrette?**
 - a) Chiamare subito il medico ed attendere le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche
 - b) Valutare lo stato di coscienza, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, controllare eventuali drenaggi, la medicazione della ferita e informare il medico
 - c) Valutare lo stato di coscienza, eseguire un prelievo ematico venoso per controllare il valore della glicemia, dell'emocromo e il tempo di coagulazione e chiamare il medico
 - d) Valutare lo stato di coscienza, tranquillizzare il paziente, spiegare che è solo l'effetto dell'anestesia e che il medico passerà in reparto al più presto
2. **Quale, tra le seguenti, è un'indicazione al posizionamento del catetere vescicale durante un intervento chirurgico?**
 - a) Necessità di mantenere la vescica vuota
 - b) Prevenire le infezioni alle vie urinarie
 - c) Aumentare la diuresi nel post operatorio
 - d) Diminuire il rischio di ematuria
3. **Quali, tra le seguenti, rappresentano segni e sintomi di infezione della ferita chirurgica?**
 - a) Rossore, edema, ipotermia
 - b) Rossore, dolore, cianosi cutanea
 - c) Rossore, dolore, presenza di essudato, edema, calore
 - d) Nessuna delle risposte
4. **L'apertura chirurgica delle cavità addominale si definisce:**
 - a) Toracotomia
 - b) Sternotomia
 - c) Lobotomia
 - d) Laparotomia
5. **Ai sensi del D.Lgs 81/08, la formazione dei lavoratori deve avvenire:**
 - a) Entro un anno dall'assunzione, dal trasferimento o cambiamento di mansioni, dall'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
 - b) In occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
 - c) Almeno 30 giorni prima dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro e di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi
 - d) Dipende dalla singola Azienda Sanitaria
6. **Cosa si intende con la sigla DPI di cui all'Art 74 del D.Lgs 81/08?**
 - a) Dispositivi di Protezione Individuale
 - b) Dispositivi di Prevenzione Individuali
 - c) Dispositivi di Protezione Indispensabili
 - d) Dispositivo di Precauzione Indispensabile

7. **Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle Infezioni Correlate ai Processi Assistenziali?**
- a) Il lavaggio delle mani
 - b) La dotazione di disinfettanti e antibiotici
 - c) L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti
 - d) Il ricambio della biancheria da letto
8. **Le restrizioni legate all'assunzione di cibi o liquidi nel pre-operatorio sono finalizzate a:**
- a) Evitare l'ipotermia
 - b) Prevenire il rischio di inalazione
 - c) Evitare l'iperglicemia durante l'intervento chirurgico
 - d) Ridurre il rischio emorragico
9. **Cosa s'intende per vigilanza e sorveglianza nell'immediato post-operatorio?**
- a) La periodica valutazione dello stato di coscienza, della funzione respiratoria, cardiocircolatoria, della diuresi, dei drenaggi, della temperatura e del dolore
 - b) La periodica valutazione della funzionalità renale ed epatica attraverso l'esecuzione di un prelievo ematico
 - c) La periodica valutazione del monitor e della diuresi al fine di evitare potenziale ritenzione acuta d'urine
 - d) La periodica valutazione dello stato di coscienza, della funzione respiratoria, cardiocircolatoria, della diuresi, dei drenaggi e della temperatura
10. **Quale normativa definisce l'obbligo di iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche?**
- a) Legge 43/2006
 - b) L. 251/2000
 - c) DM 739/94
 - d) L.42/99
11. **Quale normativa definisce il Profilo Professionale dell'Infermiere?**
- a) DM 739/94
 - b) L. 251/2000
 - c) Legge 43/2006
 - d) L. 42/99
12. **Quali fra le seguenti misure di prevenzione si sono dimostrate particolarmente efficaci nel ridurre l'incidenza di infezione delle vie urinarie catetere correlate:**
- a) Lavaggi vescicali quotidiani
 - b) L'adozione di un sistema di drenaggio a circuito chiuso
 - c) L'effettuazione di ginnastica vescicale ogni 4 ore
 - d) Sostituzione adottando tecnica sterile del catetere vescicale ogni 3 giorni
13. **Quali fra le seguenti è una modalità corretta per identificare un assistito:**
- a) Ripetere all'assistito il suo nome, cognome così che possa confermare la correttezza
 - b) Far indossare un braccialetto identificativo inamovibile riportante nome, cognome e data di nascita dell'assistito
 - c) Apporre il nome dell'assistito sulla testata del letto, sul comodino o all'ingresso della stanza di degenza
 - d) Affidarsi alla presenza di parenti o famigliari a noi noti
14. **L'assistenza alla persona in ossigenoterapia prevede:**
- a) L'educazione della persona ad una corretta igiene orale e delle narici
 - b) Una corretta umidificazione del flusso di aria per prevenire la secchezza della mucosa nasale
 - c) Il controllo dell'integrità cutanea delle zone a contatto con il presidio di somministrazione
 - d) Tutte le risposte sono corrette

15. Perché è necessario posizionare in scarico l'arto immobilizzato con apparecchio gessato?
- a) Per evitare infezioni
 - b) Per prevenire la macerazione della cute
 - c) Per favorire il ritorno venoso e prevenire l'edema
 - d) Per accelerare la guarigione
16. La scala di Braden:
- a) Analizza dieci variabili che descrivono l'autonomia nelle attività di vita quotidiana
 - b) Analizza sei fattori che descrivono le condizioni di vita del paziente anziano
 - c) Analizza sei fattori per valutare il rischio di insorgenza di lesioni da pressione
 - d) Analizza sette variabili che descrivono il rischio di insorgenza di lesioni da grattamento
17. Definizione di un evento che potenzialmente avrebbe potuto dar luogo ad un incidente ma che un intervento correttivo dell'operatore ha evitato:
- a) Near missing event
 - b) Incident reporting
 - c) Role playing
 - d) Evento avverso
18. L'infermiere dà le seguenti indicazioni a un utente che deve eseguire una urinocoltura
- a) Le urine vanno raccolte nelle 24 ore
 - b) Le urine vanno raccolte la sera prima
 - c) Le urine devono essere raccolte in un recipiente sterile dopo aver lavato i genitali esterni raccogliendo il mitto intermedio
 - d) Le urine devono essere raccolte al mattino in un recipiente sterile dopo aver lavato i genitali esterni
19. Per verificare l'affidabilità dell'autoclave a vapore con il controllo giornaliero si utilizza:
- a) Il test di Johnson
 - b) Il test Dark Blue
 - c) Il test prova secondo metodo rapido e biologico
 - d) Il test Bowie-Dick
20. Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da:
- a) Batteri
 - b) Virus respiratori
 - c) Protozoi
 - d) Miceti
21. La registrazione della frequenza respiratoria prevede:
- a) La misurazione e la trascrizione degli atti respiratori compiuti dalla persona ogni 30 secondi
 - b) La registrazione delle caratteristiche del respiro
 - c) La valutazione degli atti respiratori compiuti dalla persona
 - d) La registrazione degli atti respiratori compiuti dalla persona in un minuto
22. Quale dei seguenti NON è un fattore favorente le infezioni nosocomiali?
- a) Il reparto di terapia intensiva (tipologia delle patologie ospitate)
 - b) L'impiego di farmaci immunosoppressori o citostatici
 - c) La presenza di dispositivi invasivi (CVP, CVC, CV, Ecc.)
 - d) L'utilizzo di materiale sterile monouso
23. Quali caratteristiche deve presentare confezionamento del materiale sterile?
- a) Il viraggio di colore degli indicatori di sterilità, data di sterilizzazione
 - b) L'integrità della confezione, il codice dell'operatore che ha eseguito la sterilizzazione, la data di scadenza

- c) L'integrità della confezione, il viraggio di colore degli indicatori di sterilità, la data di scadenza sulla confezione.
- d) Solo la data di scadenza
24. **In un paziente portatore di drenaggio addominale in seguito ad intervento chirurgico, cosa deve monitorare l'infermiere?**
- a) Sede e tipologia del drenaggio, corretto funzionamento, quantità e qualità del liquido drenato
- b) Sede e tipologia del drenaggio
- c) Corretto funzionamento del drenaggio e dolore
- d) Nessuna delle precedenti
25. **Nel caso di nutrizione parenterale totale, quali complicanze possono presentarsi?**
- a) Settiche
- b) Meccaniche
- c) Metaboliche
- d) Tutte le risposte sono corrette
26. **Di che colore sono le feci acoliche?**
- a) Bianco
- b) Grigio
- c) Nero
- d) Verdastro
27. **Le lesioni da pressione necessitano di una detersione routinaria. E' raccomandato pertanto l'utilizzo di:**
- a) Disinfettanti a base di iodopovidone
- b) Soluzione fisiologica
- c) Clorexidina
- d) Sali di Ammonio Quaternario
28. **Nell'esecuzione della clearance creatinica delle 24 ore, il paziente nel raccogliere le urine deve:**
- a) Includere la minzione di inizio della raccolta e tutte le successive compresa quella di chiusura della raccolta
- b) Includere la minzione di inizio raccolta e tutte le successive esclusa quella di chiusura della raccolta
- c) Escludere la minzione di inizio raccolta e includere tutte le successive compresa quella di chiusura della raccolta
- d) Escludere la minzione di inizio raccolta e includere tutte le successive esclusa quella di chiusura della raccolta
29. **La scala di Conley è uno strumento utilizzato per:**
- a) La valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana
- b) La predizione del rischio di lesione da decubito
- c) La predizione del rischio di malnutrizione
- d) La predisposizione del rischio di caduta
30. **Con quale modalità viene classificato il grado di gravità/priorità di un paziente che accede al Pronto Soccorso?**
- a) Attraverso l'attribuzione di un codice colore o numerico
- b) Attraverso la consegna di un numero progressivo in relazione all'arrivo del paziente
- c) Attraverso la disponibilità del personale sanitario nelle sale visita
- d) Attraverso i dati che l'infermiere rileva nella documentazione del paziente